



# MODELOWANIE UST KWASEM HIALURONOWYM

**Kwas hialuronowy** jest substancją naturalnie występującą w organizmie człowieka. Z wiekiem dochodzi do zmniejszenia jego produkcji, co skutkuje bardziej suchą i zwiotczałą skórą.

Modelowanie ust kwasem hialuronowym to zabieg dla osób, które chcą skorygować kształt swoich warg, poprawić ich napięcie, jędrność lub naturalnie podnieść kontur.

Pierwsze efekty modelowania widoczne są natychmiast. Usta stają się jędrne, zaznacza się wyraźny kontur oraz odzyskują intensywność koloru. Na ostateczny efekt nowo wymodelowanych ust należy poczekać do 2 tygodni. Trwałość zabiegu modelowania ust zależy od kilku czynników. Efekt modelowania ust najczęściej utrzymuje się do roku. Co ważne, nawet po całkowitym wchłonięciu się kwasu, następuje wyraźna poprawa struktury tkanek ust.

## WSKAZANIA

- potrzeba zaznaczenia konturu,
- potrzeba zwiększenia objętości,
- korekta kształtu,
- zanik czerwieni wargowej,
- wąskie usta,
- asymetria warg.

## PRZED ZABIEGIEM:

- Zaprzestanie stosowania leków przeciwkrzepliowych, aspiryny, NLPZ, witaminy E i innych obniżających krzepliwość krwi na 7-10 dni przed zabiegiem (nie dotyczy pacjentów po udarze lub zawale)
- Na 2-3 dni przed zabiegiem powstrzymać się od spożycia alkoholu

- Przy tendencji do opryszczki stosować Herviran 200 mg 4 razy dziennie przez 3 dni

## PO ZABIEGU:

- Bezpośrednio po zabiegu należy utrzymywać miejsce iniekcji w szczególnej czystości, nie dotykać miejsca wkłucia brudnymi rękami
- Nie pić gorących napojów, nie palić papierosów przez 4 h po zabiegu
- Unikać całowania, nadmiernej mimiki i spania twarzą do poduszki przez 4-5 dni
- Nie nakładać makijażu 24 h po zabiegu
- Pić minimum 2 l wody dziennie
- Nie spożywać alkoholu 24-48 h po zabiegu
- Powstrzymanie się od intensywnych ćwiczeń przynajmniej przez 3 dni po zabiegu
- Unikanie słońca, solarium, sauny, gorących kąpieli

Zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego wiążą się z ryzykiem wystąpienia powikłań dlatego przed zabiegiem nasz lekarz przeprowadzi z Tobą wnikliwą rozmowę, by wykluczyć przeciwwskazania do zabiegu i zminimalizować ryzyko powikłań.